

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

జనగాం జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 35-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 23-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 17-29 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 18-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా రైతాంగానికి  
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 37-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 23-31 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రైతాంగానికి  
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 37-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 21-30 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

మెదక్ జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 40-42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-20 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 16-28 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 16-20 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా రైతాంగానికి  
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 17-33 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా రైతాంగానికి  
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 37-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 19-32 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 32-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



**బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021**

**నల్గొండ జిల్లా రైతాంగానికి**

**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



**గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)**

**భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.**

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 37-42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 18-33 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

రంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 18-33 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 18-21 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

సంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 40-42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-20 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 16-29 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 16-20 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

సిద్దిపేట జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 40-42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-20 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 17-31 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 18-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

సూర్యాపేట జిల్లా రైతాంగానికి  
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 37-42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-26 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901



**ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**కరీంనగర్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసాయి.

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం , వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 35-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 24-28 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 57-82% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 40-69% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 11-29 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరోట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటీ మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.

- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నేడల్ ఆఫీసర్



**ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**నిజామాబాదు జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసాయి.

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 34-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 25-29 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 53-75% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 37-60% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 12-28 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటీ మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.

- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,  
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా  
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**ఆదిలాబాద్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి.

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 65-77% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 38-54% మధ్య ఉండవచ్చు. నైరుతీ దిశ నుండి గాలులు గంటకు 10-17 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు

గమనిక : జూన్ 9 న& 13 జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.

- నేల 15-20 సెంటీ మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్పృంక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నోడల్ అఫీసర్



**ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**ఖమ్మం జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసాయి.

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 32-39 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 63-94% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 35-75% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 11-15 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 13 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరోట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటీ మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.

- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నేడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**కొమురం భీమ్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 25-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 66-89% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 44-58% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 10-20 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.

- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథ్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**నిర్మల్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 25-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 64-80% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 35-67% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 13-22 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 13 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది

అనువైన సమయం.

- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

**పశుపోషణ**

**గేదలు**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**గొర్రె**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**కోళ్ళు**

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**మంచిర్యాల జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 34-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 20-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 55-103% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 41-68% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 12-16 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

## పశుపోషణ

### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింగ్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథ్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**జగిత్యాల జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 69-81% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 43-64% మధ్య ఉండవచ్చు. నైరుతీ దిశ నుండి గాలులు గంటకు 13-22 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది

అనువైన సమయం.

- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

**పశుపోషణ**

**గేదలు**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**గొర్రె**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**కోళ్ళు**

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**పెద్దపల్లి జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 36-39 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 24-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 64-85% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 38-59% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 14-26 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.

- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింగ్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నేహస్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**కామారెడ్డి జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 24-28 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 56-72% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 38-70% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 13-22 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 13 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది

అనువైన సమయం.

- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

**పశుపోషణ**

**గేదలు**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**గొర్రె**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**కోళ్ళు**

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 25-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 62-87% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 40-70% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 14-31 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటీ మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.

- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**జయశంకర్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 25-28 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 57-103% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 41-88% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 5-44374 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సెంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.

- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింగ్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నేహస్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**వరంగల్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 24-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 64-94% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 41-85% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 13-21 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సెంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.

- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింగ్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నేహస్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**మహబూబాబాద్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 35-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 25-27 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 60-97% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 41-64% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 10-24 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఈదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరోట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియదున్నాలి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటి మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.

- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

**పశుపోషణ**

**గేదలు**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**గొర్రె**

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

**కోళ్ళు**

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

**(ఎస్. నవత)**

**సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త**

**(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)**

**నోడల్ ఆఫీసర్**



**ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం**  
**ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,**  
**పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా**  
**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**



**భద్రాద్రి జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు**

**బులెటిన్ నం 46/2021**

**తేదీ: 08.06.2021**

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రత (గరిష్ట) 34-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది ఉదయం తేమ . 59-95% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 34-89% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 10-14 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జూన్ 9 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో అతిభారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జూన్ 10 న నుండి 12 వరకు ఉరుములు మెరుపులు మరియు ఉదురు గాలులు మరియు వర్షం జిల్లాలో ఒకటి రెండు చోట్ల పడే అవకాశం కలదు. జూన్ 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

**వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు**

- పొలాలలో సేంద్రియ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాలి. జనుము, జీలుగ మరియు పిల్లిపెసర వంటి పచ్చిరొట్ట పంటలను పెంచుకోవాలి. ఈ విత్తనాలు పొలంలో వెదజల్లి 20 నుంచి 30 రోజుల తరువాత నేలలో కలియిస్తున్నాయి.
- ఋతుపవనాలు ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక నేలల్లో 60-70 మి.మీ. బరువు నేలల్లో 60-75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు అయిన తరువాతే పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నేల 15-20 సెంటీ మీటర్ల లోతు తడిసిన తరువాతే వర్షాధార పంటలైన మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు, కంది, పెసర మరియు ప్రత్తి వంటి పంటలను విత్తుకోవాలి.
- వర్షాధార పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- కొత్త పండ్ల తోటలు పెట్టడానికి గుంతలు తవ్వాలి.

- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు దీర్ఘ కాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

#### పశుపోషణ

##### గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు మరియు గాలి కుంటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### గొర్రె

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు మసూచి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.

##### కోళ్ళు

- గదిలో స్ప్రింక్లర్లు లేదా తడి గొనె సంచులు ఉంచుట వలన గది ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి.
- కోళ్ళకు నీటిని ఇచ్చే నీటితొట్టిలు మరియు పైపులను గొనె సంచులతో కప్పాలి, దాని వలన చల్లటి నీటిని అందించవచ్చు.
- సరియైన గాలి వెలుతురు ఉండేటట్లు మరియు అమోనియా బయటికి వెళ్ళేటట్లు చూసుకోవాలి.
- కోళ్ళకు ఉదయం, సాయంత్రం మరియు రాత్రి వేళల్లో చల్లటి సమయంలో దాణా అందుబాటులో ఉంచాలి.

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నేడల్ ఆఫీసర్

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

వికారాబాద్ జిల్లా రైతాంగానికి  
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 19-30 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 17-20 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

**వనపర్తి జిల్లా రైతాంగానికి**

**వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



**గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)**

**భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.**

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 37-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 22-31 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

వరంగల్ జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 35-36 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 23-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 17-24 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33-38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం  
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం  
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/45/2021

యదాద్రి జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 09.06.2021 (బుధవారం) నుండి 13.06.2021 (ఆదివారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

### గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 37-42 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

### రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 17-31 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 19-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

**హెచ్చరిక:** రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

### వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోకి జూన్ 05 వ తేదీన ప్రవేశించింది.
- వర్షాధారపు పంటలను సరైన సమయంలో విత్తుకోడానికి విత్తనాలు, ఎరువులు మరియు పురుగు మందులు సేకరించుకోవాలి.
- నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్రంలోనికి ప్రవేశించిన తరువాత తేలిక పాటి నేలల్లో 50 నుంచి 60 మి.మీ. మరియు బరువు నేలలో 60 నుంచి 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైన తరువాత లేదా నేల 15-20 సెం.మీ. లోతు తడిసిన తరువాతనే రైతులు వర్షాధార పంటలైన సోయాచిక్కుడు, జొన్న, కంది, పెసర, ప్రత్తి మొదలగు పంటలను విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు దీర్ఘకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- వరి సాగు చేసే పొలాల్లో, తొలకరి వర్షాలను ఉపయోగించుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచ్చి రొట్ట పైరుగా, ఆలస్యంగా నీరు విడుదలయ్యే ప్రాంతాలలో పెసరను పైరుగా లేనిచో పచ్చి రొట్టగా విత్తుకోవాలి.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జూన్ నెలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.

### కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- కూరగాయ పంటలలో పొగాకు లద్దెపురుగు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 1.25 మి.లీ. నోవాల్యూరాన్ మందును లీటరు నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

### కోళ్ళు:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు కోళ్ళలో కొక్కిర తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు టీకాలు వేయించాలి.
- కోళ్ళు వేడి వాతావరణాన్ని తట్టుకొనుటకు పెద్దల్లో ఫ్యాన్లను మరియు ఫాగర్స్ ను అమర్చి పెద్దపై వరిగడ్డితో కప్పి స్ప్రింక్లర్లను అమర్చాలి. కోళ్ళు ఎక్కువ మోతాదులో తినుటకు అనుగుణంగా మెత్తటి దానాను పెట్టి త్రాగుటకు చల్లని నీటిని అందుబాటులో ఉంచాలి.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్

ఫోన్. నెం 040-24016901