

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

జనగాం జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 24-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 11-19 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30-32 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సొత్త పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

జోగుళాంబ గద్వాల జిల్లా రైతాంగానికి
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-23కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 28-30 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సొళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోస (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోవ్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

**మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రైతాంగానికి
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు**

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-21కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

మెదక్ జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 32-33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 12-25 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లా రైతాంగానికి
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-24 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29-30 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా రైతాంగానికి
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-21కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30-32 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

నల్గొండ జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 36-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 18-26 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 32-34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోవ్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

రంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 17-23 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29-30 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

సంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 32-33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 12-24 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 28-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోస (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోవ్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

సిద్దిపేట జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 32-33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-20 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 28-30 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సొళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

సూర్యాపేట జిల్లా రైతాంగానికి
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 36-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 10-18 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 30-33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోస (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



కరీంనగర్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 29-32 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 73-88% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 48-77% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 18-24 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : తేదీ 10 నుండి 13 వరకు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు. 14 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేదీ లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేదీ నుండి జులై 25 వ తేదీ వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జూలై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక

రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్నోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



నిజామాబాదు జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 27-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 22-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 73-92% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 57-81% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 13-21 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 11 న, 12 న & 14 న ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జులై 12 న , 13 న ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలి;

రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



ఆదిలాబాద్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 28-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 22-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 87-98% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 67-82% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 14-23 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 న నుండి 14 వరకు ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొస (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక

రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండీ:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



ఖమ్మం జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో. తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 33-34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 69-88% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 52-73% మధ్య ఉండవచ్చు. నైరుతీ దిశ నుండి గాలులు గంటకు 10-16 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 న , & 11 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

తేదీ 12 నుండి 14 వరకు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జూలై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).
- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



కొమురం భీమ్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 28-33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 89-96% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 66-85% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 9-19 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 న , 11 న ,13 న & 14 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. 12 న ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొస (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జూలై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).
- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



నిర్మల్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 27-33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 22-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 80-97% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 57-80% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 16-22 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 న నుండి 14 వరకు ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోస్పిర్మాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంటు నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



మంచీర్యాల జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 27-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 81-90% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 53-78% మధ్య ఉండవచ్చు. నైరుతీ దిశ నుండి గాలులు గంటకు 12-29 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 13 న&15 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. 10 నుండి 12 వరకు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జూలై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).
- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



జగిత్యాల జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

గత మూడు రోజుల్లో వివిధ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 29-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 24-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 78-89% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 50-75% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 17-22 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 నుండి 14 వరకు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).
- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే

ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి

- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

నోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ

చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్స్ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



పెద్దపల్లి జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 29-32 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 24-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 74-90% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 54-72% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 17-25 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 న , 13 న & 14 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. 11 న & 12 న ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సొల్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంటు నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొప్పురాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



కామారెడ్డి జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఒక మోస్తరు నుండి భారీ వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 28-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 76-93% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 53-81% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 12-19 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 11 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జులై 7 న నుండి 10 వరకు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను పుత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొస (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోస్పల్సాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక

రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రో. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 29-32 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 77-89% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 49-78% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 17-24 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : తేదీ 10 నుండి 13 వరకు ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు. 14 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోస్ ల్యాప్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక

రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



జయశంకర్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 29-33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 82-86% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 59-92% మధ్య ఉండవచ్చు. నైరుతీ దిశ నుండి గాలులు గంటకు 7-19 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. 10 నుండి 12 వరకు మరియు 14 న ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొస (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).
- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే

ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి

- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బోఫ్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

నోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ

చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



వరంగల్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 29-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 24-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 82-88% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 56-77% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 13-15 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 13 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. 10 నుండి 12 వరకు మరియు 14 న ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంటు నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొప్పురాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



మహబూబాబాద్ జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు నుండి భారీ వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 30-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 23-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 73-92% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 62-76% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 11-14 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 నుండి 113 వరకు జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. జులై 14 న ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

వరి

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జులై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).

- 5 సెంటు నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బొప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్నాథన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్



ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం,
పొలాస, జగిత్యాల జిల్లా
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు



భద్రాద్రి జిల్లా యొక్క రైతులకు వ్యవసాయ సలహాలు

బులెటిన్ నం 55/2021

తేదీ: 09.07.2021

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం నుండి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే 5 రోజులలో జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో ఓ మోస్తరు వర్ష సూచన కలదు. పగటి (గరిష్ట) ఉష్ణోగ్రత 30-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత (కనిష్ట) 22-22 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉంటుంది. ఉదయం తేమ 79-95% మరియు మధ్యాహ్నం తేమ 63-79% మధ్య ఉండవచ్చు. వాయువ్యదిశ నుండి గాలులు గంటకు 9-24 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం కలదు.

గమనిక : జులై 10 న , 13 న & 14 న జిల్లాలో ఒకటి రెండు ప్రదేశాలలో భారీ వర్షం వచ్చే అవకాశం కలదు. 11 న & 12 న ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే అవకాశం కలదు.

వాతావరణ ఆధారిత సలహాలు

- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జులై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ల పద్ధతిలో జులై 15 వ తేది లోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సమృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాలలో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్లు పోసుకొనుటకు ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సొన (RNR 15048) వరి విత్తనాన్ని జులై 10 వ తేది నుండి జులై 25 వ తేది వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వర్షాధార పరిస్థితులలో తేలికపాటి నేలల్లో పత్తి మరియు సోయాచిక్కుడు విత్తరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా కార్బండిజిమ్ మరియు 30 గ్రా కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తనశుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- నారుమడి విత్తుకాలం : జూన్ 20 నుండి జూలై 15 వరకు (మధ్య మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు). ఆగస్టు వరకు (అతి స్వల్పకాలిక రకాలు).
- 5 సెంట్ల నారుమడికి 2 కిలోల నత్తజని, 1 కిలో భాస్వరం మరియు 1 కిలో పోటాష్ నిచ్చే ఎరువులను దుక్కిలో వేయాలి
- విత్తిన 10 రోజులకు కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలు సెంటు నారుమడికి 160 గ్రా. చొప్పున వేయాలి

సోయాచిక్కుడు

- విత్తుకాలం : జూన్ - జూలై మొదటి వారం వరకు

పెసర

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - జూలై 15

మినుము

- విత్తుకాలం: జూన్ 15 - జూలై 15

కందులు

- విత్తుకాలం : జూన్ 15 - ఆగస్టు 15

ప్రత్తి

- విత్తుకాలం : వర్షాధారంగా : జూలై 20
నీటిపారుదల: జూన్ 15 - జూలై 15
- ప్రత్తి చుట్టూ నాన్ బి.టి ప్రత్తి విత్తనాలను తప్పనిసరిగా 5-6 వరుసలలో విత్తుకోవాలి.

పసుపు

- విత్తుకాలం : మధ్యస్థ మరియు స్వల్పకాలిక రకాలు: జూన్-జూలై
దీర్ఘకాలిక రకాలు: జూన్ 15 - జూలై 30
- ఎత్తు మడుల పద్ధతిలో పసుపును విత్తుకోవాలి. ఈ పద్ధతిలో మీటరు వెడల్పు, మడికి మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు కాలువ ఉండేటట్లు తయారుచేసుకోవాలి. వరుసల మధ్య 30 సెంటీమీటర్లు, దుంపల మధ్య 15 సెంటీమీటర్లు ఎడం ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి

కూరగాయలు:

- విత్తనాలను ఎత్తయిన నారుమడులలో 10 సెంటీమీటర్ల ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవాలి
- నారుమడులలో మురుగు నీరు పోయే వసతి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
- కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ తో విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నట్లయితే నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగు మరియు ఆకుపచ్చ తెగులు నివారించవచ్చు.

మిరపకాయ

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు తామరపురుగు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు, ఎసిఫేట్ @ 1.5 గ్రా లేదా పిప్రోనిల్ @ 2 మి.లీ లేదా డైమెథోయేట్ 2 మి.లీ. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

టమాటా

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు ఆకుఎండుతెగులు ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున నివారణకు కాపర్ ఆక్సీ క్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

బెండి:

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు పచ్చదోమ ఆశించే అవకాశం ఉన్నందున ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 1 మి.లీ లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేయాలి.

పశుపోషణ

గేదలు

- ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులు నిమోనియా మరియు గొంతు వాపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీటి నివారణకు టీకాలు వేయించాలి

(ఎస్. నవత)

సేద్యవిభాగ శాస్త్రవేత్త

సాంకేతిక అధికారి (AMFU-Jagtial)

(డాక్టర్ పి. జగన్మోహన్ రావు)

నోడల్ ఆఫీసర్

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

వికారాబాద్ జిల్లా రైతాంగానికి
వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-21 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29-32 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 20-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోవ్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

వనపర్తి జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మోసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 22-25 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-22కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 23-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

వరంగల్ జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33-35 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 24-26 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 14-21 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 29-31 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 23-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోప్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901

ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం
వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం
వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్, హైదరాబాద్.



బులెటిన్ నెం. XXXII/54/2021

యదాద్రి జిల్లా రైతాంగానికి

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

తేది: 10.07.2021 (శనివారం) నుండి 14.07.2021 (బుధవారం) వరకు



గ్రామీణ కృషి మౌసమ్ సేవ పథకం (GKMS Project)

భారత వాతావరణ శాఖ, న్యూఢిల్లీ.

గత మూడు రోజుల వాతావరణం:

గడిచిన మూడు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 36-37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-24 డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదయ్యాయి.

రాబోవు ఐదు రోజుల వాతావరణం:

హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వారు అందించిన సమాచారం ప్రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి. దక్షిణ దిశ నుంచి గాలులు 15-18 కి.మీ. వేగంతో వేయవచ్చును. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 28-30 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 21-23 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య నమోదుకావచ్చు.

హెచ్చరిక: రాబోవు ఐదు రోజులలో జిల్లాలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నాయి.

వాతావరణ ఆధారిత వ్యవసాయ సలహాలు

- రాబోవు ఐదు రోజులు అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలున్నందున, పంట పొలాల్లో నుండి మురుగు నీటిని తీసివేయాలి.
- కంది పంటను ప్రత్తి మరియు మొక్కజొన్న పంటలలో జలై మొదటి పక్షంలో అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.
- మొక్కజొన్న, సోయాచిక్కుడు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పద్ధతిలో జలై 15వ తేదీలోపు విత్తుకోవాలి.
- నీరు సంవృద్ధిగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో రైతులు మధ్యకాలిక వరి రకాల నారుమళ్ళు పోసుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం.
- రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR15048) వరి విత్తనాన్ని జలై 10వ తేదీ నుండి జలై 25 వరకు నారు పోసుకోవాలి.
- వరి నారుమళ్ళలో కార్బోవ్యూరాన్ 3 జి గుళికలను 200 చ.మీ. నారుమడికి (5 సెంట్లకు) ఒక కిలో చొప్పున నారు పీకే వారం రోజుల ముందు చల్లుకోవాలి.
- తేలిక పాటి నేలల్లో ప్రత్తి మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయరాదు.
- పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలలో కిలో విత్తనానికి 2.5 గ్రా. కార్బండజిమ్ మరియు 30గ్రా. కార్బోసల్ఫాన్ మందును కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసి విత్తుకోవాలి.

- కంది మరియు ప్రత్తి (1:4 లేదా 1:6), కంది మరియు జొన్న (1:4), కంది మరియు సోయాచిక్కుడు (1:7) పంటలను అంతరపంటలుగా సాగుచేసుకోవాలి.

కూరగాయలు:

- కూరగాయ పంటలలో రసం పీల్చే పురుగులు గమనించినట్లైతే, నివారణకు 2 మి.లీ. డైమిథోయేట్ లేదా 1.5 గ్రా. ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.
- అధిక వర్షాలు మరియు ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండడం వలన కూరగాయ పంటల నారుమళ్ళలో నారు కుళ్ళు తెగులు సోకుటకు అనుకూలం. నివారణకు ఈ క్రింది యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించవలెను.
 - 3 గ్రా. కాపర్-ఆక్సీ-క్లోరైడ్ మందును ఒక లీటరు నీటికి కలిపి నారుమడిని పూర్తిగా తడపాలి.
 - నారుమళ్ళలో మురుగు నీటి వసతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 - విత్తే ముందు కిలో విత్తనానికి 5 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మరియు 3 గ్రా. కాప్టాన్ చొప్పున విత్తనా శుద్ధి చేసి నారుమడిలో రసం పీల్చే పురుగులు మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చును.
 - విత్తనాలను ఎత్తైన నారుమళ్ళలో 10 సెం. మీ ఎడంతో వరుసలలో విత్తుకోవలెను.

ప్రధాన శాస్త్రవేత్త (అగ్రానమి)& అధిపతి

ప్రకటన ప్రధాన శాస్త్రవేత్త, వ్యవసాయ వాతావరణ పరిశోధన కేంద్రం, వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థ, రాజేంద్రనగర్
ఫోన్. నెం 040-24016901